Uso de compostos naturais biologicamente ativos na nutrição de ruminantes

**Harold Ospina Patino, Zootecnista, D.Sc.
Curso de Zootecnia – UFRGS- Brasil**

VII Congresso Brasileiro de Agropecuária Sustentável

Viçosa, 11 de setembro de 2015

Conteúdo

- **Externalidades**
- **Sustentabilidade na pecuária**
- **Compostos bioativos**
- **Consideraciones finales**

Vetores da agenda mundial

Drivers da demanda mundial

Crescimento da População
(bilhões)

Urbanização (bilhões)

PIB (variação % anual)

Fontes: ONU (dez/2010) e FMI (abr/2011). Elaboração: Fiesp-Deagro

70%

9 Bilhões

2050

Intensificação
Sustentável

7 Bilhões

2014

GEE (CO₂, CH₄ e N₂O)

COP 15
Programa ABC

Água
Energia

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Área Agricultável Disponível

Nota: O dado sobre a área disponível no Brasil exclui a Amazônia Legal.

Fonte: FAO

Mudanças na produção e comercialização de bovinos

Editoria de arte/Folhapress

DOMÍNIO DO FRANGO

Consumo de carne bovina tem ritmo menor

CONSUMO, EM QUILOS PER CAPITA

CAMINHO INVERSO

Ritmo da avicultura é mais acelerado

PRODUÇÃO ANUAL, EM MILHÕES DE TONELADAS

*Estimativas **14,69 quilos Fonte: Informa Economics FNP

NOVO PATAMAR

Arroba** de boi gordo em alta
Valor médio anual, em R\$

A pastagem, um fator de baixo custo na pecuária do passado, perde terreno para outras atividades agrícolas... Na última década, a pecuária perdeu 7 milhões de hectares e deverá perder outros 13 milhões nos próximos dez...

Neste contexto a solução é aumentar a produtividade por hectare...

Para voltar a ter as mesmas margens de lucro da década dos 70, os pecuaristas teriam que produzir 10 arrobas por hectare por ano e hoje só produzem 5.

BR: 200 milhões de ha

RS: 30 milhões de ha

Sistemas de produção baseados em tecnologias de insumos

RS: 11.7 milhões de ha
CN

RS: 4.9 milhões de ha

(Fonte: IBGE e MAPA)

Insustentabilidade do modelo agropecuário “moderno”

- **Degradação dos recursos naturais: solos, água, perda de biodiversidade, contaminação, erosão genética, erosão cultural,**
- **Dependência crescente de insumos (combustíveis fósseis, inseticidas, herbicidas, fertilizantes, etc.)**
- **Contaminação de alimentos. Impacto sobre a saúde de agricultores e a população em geral.**
- **Resistência crescente aos pesticidas de patógenos**
- **Diminuição da eficiência energética.**
- **Não é aplicável a um grande número de produtores agropecuários.**
- **No solucionou o problema da fome no mundo.**

Afinal: qual é a agricultura necessária?

- a) Aquela que incorpora processos de **reciclagem** de nutrientes, fixação do nitrogênio atmosférico e regulação biótica;
- b) faz gestão dos agroecossistemas, com ênfase na conservação do solo, da água, da energia e no incremento da **agrobiodiversidade**;
- c) **reduz o uso de insumos** externos e não renováveis;
- d) integra práticas e **conhecimentos locais** com o conhecimento técnico-científico;
- e) cria **relações de confiança** e interdependência entre os agricultores, a população urbana e a rural.

A Universidade esta preparada?

- Incipiente consciência sobre impacto ambiental e social, de alguns sistemas modernos de produção agropecuária.
- A “ética”: aspecto pouco considerado na formação do profissional.
- Pouca percepção sobre o papel do profissional das ciências agropecuárias na gestão sustentável dos agroecossistemas.
- A resistência a mudança, própria dos professores formados no antigo paradigma. Incerteza sobre seu papel no novo cenário.
- Ausência de massa crítica de docentes formados no enfoque holístico e sistêmico.

A Universidade esta preparada?

- **Percepção errada da Agroecologia: uma serie de receitas “sem agroquímicos.”**
- **Valorização da tecnologia insumo-dependente associada a maiores rendimentos (paradigma dominante).**
- **Docentes e pesquisadores que privilegiam suas linhas de trabalho de acordo ao número e “prestígio” de certas publicações (“paperdependencia”).**
- **Maior simplicidade: que significa a definição dos problemas desde uma só disciplina (enfoque reducionista).**

Modelo esgotado

- **Ampliação da renda popular**
- **Ampliação do consumo**
- **Aumento da exportação de commodities**

Novo Modelo

- **Capacitação educacional**
- **Criação de oportunidades produtivas**
- **Produtivismo sustentável e inclusivo**

Produtividade inclusiva com sustentabilidade

Biodiversidade funcional

A *biodiversidade funcional* considera a existencia de varias especies de plantas e animais, além das interações favoráveis e os benefícios mutuos existentes nos sistemas produtivos e seu entorno ecológico.

(Adaptado de González et al., 2010)

Biodiversidade funcional

- Proporciona uma gran variedade de **SERVIÇOS AMBIENTAIS**
- Nos sistemas produtivos, a biodiversidade cumple funções que vão além da simples produção de alimentos, fibras, energia e renda.

(Altieri, 1994)

A agricultura em processo de transição para a sustentabilidade

- Agricultores = atores sociais com competência e com papel construtivo em relação às decisões e legitimações de novos caminhos.
- Agricultura familiar = plasticidade nas diferentes conjunturas econômicas, técnicas e políticas.
- Rompimento da trajetória auto-evidente de desenvolvimento = vários níveis, -desde atores individuais até esforços político-institucionais coletivos.

“Processos propugnados de baixo para cima”

Quais os caminhos que estão envolvidos?

- ✓ Re-ordenamento de fatores de produção;
- ✓ Descobrimto de novos fatores;
- ✓ Atendimento de especificidades sócio-materiais locais;
- ✓ Integração a redes mais amplas como mercado, governo, paisagem e tecnologias;
- ✓ Fim do monopólio da especialização;
- ✓ Abertura da tomada de decisão;
- ✓ Criação de espaços privilegiados e estratégicos.

CARNES DO ALTO CAMAQUÃ

Carnes únicas de
lugares únicos

AltoCamaquã
www.altocamaqua.org

Parceiros

Carcacas e Carnes
Grupo de Pesquisa
CNPq - UFPEL

H. Ospina (UFRGS)
N. Klassen (INTTAS)

Chaco Green Beef

Producción Animal:

Ecológicamente sustentable

Socialmente justa

Económicamente viable

Los ganaderos del Gran Chaco deben buscar siempre formas de producción eficientes y sostenibles, para que las futuras generaciones puedan aprovechar los recursos productivos chaqueños.

Adaptado de Glatzle (1999)

Produção Animal Sustentável

- **Sistemas integrados**
- **Tecnologia de processos**
- **Tecnologia de informação**

Qualidade da carne

Existem evidências que a carne produzida em pastagens tem uma melhor composição de gordura do que a produzida em confinamento.

Comparação do desempenho de animais em pastejo suplementados ou não e animais confinados abatidos a um mesmo grau de acabamento

	Nível de Suplementação (% PV)						P
	0	0,4	0,8	1,2	CON	Media	
Peso Inicial (kg)	279,3	279,8	281,1	283,6	292,3	283,2	0,71
Peso Abate (kg)	447,18	453,88	424,89	444,52	431,68	440,43	0,14
Gmd (kg/dia)	1,51	1,58	1,52	1,66	1,77	1,60	0,18
PCQ (kg)	227,96	234,90	223,39	233,37	227,67	229,45	0,46
EGS (mm)	0,23	0,29	0,29	0,33	0,38	0,30	0,21
Dias Terminação	110	113	92	99	87	100,2	NA

Perfil de ácidos graxos da carne de novilhos terminados em diferentes sistemas de alimentação (g/100g FAME)

	Nível de suplementação (% PV)					
	0	0,4	0,8	1,2	CONF	P
AGS ^a	52,36 a	53,89 a	51,11 ab	52,95 a	48,59 b	0,0008
AGM ^b	44,73 b	43,32 b	46,14 ab	44,53 b	48,68 a	0,0016
AGP ^c	2,90	2,77	2,74	2,50	2,71	0,63
Relação n6:n3	1,899 b	2,310 b	2,50 b	2,68b	4,11 a	<0,001

Produção de ruminantes em pastejo

APARELHO DIGESTORIO DOS RUMINANTES

Eficiência nos sistemas pastoris

Transferência de energia num sistema pastoril de baixa eficiência na produção de leite (Viglizzo, 1981)

Produção agropecuária sustentável

- Taxa de extração de recurso naturais renováveis < capacidade de regeneração por parte do sistema
- Taxa de extração de recurso naturais renováveis < capacidade da sociedade para gerar substitutos
- Taxa de emissão de resíduos contaminantes < capacidade natural de assimilação do sistema

Ecologia vs Economia

- Sistemas de produção de baixos insumos: natureza doadora de insumos
- Sistemas de produção de altos insumos: natureza doadora de insumos e receptora de resíduos
- Efetividade de custos : menor custo ambiental possível de ser atingido para os objetivos produtivos definidos

Armadilha Termodinâmica

- Processos termodinâmicos irreversíveis
- Consumo de energia do entorno
- Forças diretrizes das reações (2ª lei da termodinâmica)
- Desenvolvimento do homem a custas da degradação do meio ambiente (entropia)
- Quanto mais ativo um sistema mais energia toma do entorno e mais resíduos descarta (GEE, contaminação de água e solo)
- Os sistemas mais produtivos são insustentáveis

Uso de nutrientes em sistemas Pecuários

- Lei do Mínimo de Liebig: a eficiência de uso de cada fator diminui a medida que se intensifica seu uso.
- Lei do ótimo de Liebscher: a eficiência de aproveitamento de um recurso depende da eficiência com que se aproveitem outros recursos.
- Agroecossistemas sustentáveis: interação de fatores relacionados com clima, solo, planta, animal dentro da lei do ótimo
- Nutrição de precisão

Nutrição de Precisão

- Conteúdo e tipo de carboidratos presentes nos alimentos: Produção de AGV, CO_2 e CH_4
- Relação energia: proteína: tipo de nitrogênio presente na dieta, síntese de proteína microbiana, excreção de N
- Relação de aminoácidos presentes no intestino
- Relação N:P

Efeito dos CHO's sobre a nutrição de vacas leiteiras

azul = normal e vermelho = alto CHO's

Aditivo

MAPA - Instrução Normativa N° 30 05 de agosto de 2009

Substancia, microrganismos ou produto formulado, adicionado intencionalmente, que não é normalmente utilizado como ingrediente, tenha ou não valor nutritivo e que melhore as características dos produtos destinados à alimentação animal ou dos produtos animais, melhore o desempenho dos animais saudáveis, preencha as exigências nutricionais ou tenha efeito anticoccidiano.

AGROS: Agroindústrias Sociais Produtividade Sustentável com Inclusão Social

Produção e usos locais de etanol hidratado para promover autosuficiência energética, desenvolvimento agrícola e segurança alimentar na Agricultura Familiar

O Grupo de estudos em Nutrição de Ruminantes (GNR – UFRGS) e o Consórcio Latino Americano e do Caribe para o Apoio da Pesquisa e Desenvolvimento da Mandioca (CLAYUCA), estão trabalhando no desenvolvimento de inovações tecnológicas para produção de bio-etanol utilizando matérias primas tais como Mandioca, Batata Doce e Sorgo Sacarino, amplamente utilizadas na agricultura familiar. Nosso objetivo é trabalhar com lavouras energéticas complementares e unidades de processamento pequenas, fáceis de operar e de baixo custo.

A mandioca, a batata doce e o sorgo sacarino são culturas que apresentam altos teores de amido (aproximadamente 70 - 85% na base seca) e carboidratos solúveis, os quais podem ser utilizados como substratos fermentáveis na produção de etanol. Além disso os coprodutos (folhas, caules e bagaço) destas lavouras podem ser utilizados na elaboração de silagem, suplementos para animais e biofertilizante.

Produção e custo de produção de etanol hidratado usando Mandioca, Batata doce e Sorgo sacarino como matérias primas.

	Mandioca	Batata doce	Sorgo sacarino
Produção agrônômica (t/ha/ano)	27	60	105
Produção de etanol (Lt matéria prima)	220	125	40
Produção de etanol (L/ha)	6,000	7,500	4,200

Usos validados do etanol hidratado combustível

Fogão clean cook

Veículo ecológico

Geração de energia

O etanol hidratado combustível produzido a partir de cultivos energéticos permitirá que as comunidades rurais tenham acesso a energia elétrica para implantar processos de transformação e agregação de valor em seus produtos, de modo a se vincular com mercados que garantam segurança alimentar, maiores ingressos e melhoria na sua qualidade de vida.

Sorgo Sacarino

Mandioca

Batata Doce

Suplementação

**Adição de nutrientes estratégicos na dieta dos ruminantes
para otimizar a digestão e o metabolismo dos nutrientes
Contidos nas pastagens**

Uso de suplementação em Novilhas

	Tratamientos			
Variáveis	0.8 MI	0.5 MIVmax	0.8 MIVmax	P
Peso inicial (kg)	236.51±44.61	231.14±44.57	234.22±44.56	0.71
Peso final (kg)	255.67±50.16	250.88±50.11	261.70±50.11	0.32
GMD (kg/dia)	0.28±0.04 b	0.27±0.04 b	0.39±0.04 a	0.09
ECC inicial (1-5)	2.68±0.03	2.66±0.03	2.67±0.03	0.86
ECC final (1-5)	2.69±0.03	2.71±0.03	2.71±0.03	0.81
FRAME inicial	5.81±0.17	5.28±0.17	5.53±0.17	0.45
FRAME final	5.81±0.23	5.28±0.23	5.53±0.23	0.30
AOL (cm ²)	51.57±18.96	49.77±18.96	45.76±18.96	0.11
EGS (mm)	3.21±0.51	2.32±0.51	2.90±0.51	0.47
EGP (mm)	4.37±0.75	3.37±0.75	5.69±0.75	0.12
ETR (1-5)	1.77±0.17	1.77±0.17	1.71±0.18	0.94

Uso de Suplementação em Novilhas

	Suplementos		
	0.8 MI	0.5 MIVmax	0.8 MIVmax
Consumo (kg)	137.29±0,56 ^b	83.76±0,56 ^a	137.38±0,56 ^b
Peso ganho(kg)	21.29±2,72	19.75±2,55	27.50±2.55
CA	6.58±0.63	4.96±0.59	5.43±0.59
Custo total (R\$)	337.23±30.15 ^b	191.28±28.21 ^a	313.52±28.21 ^b
R\$/kg	15,84 ^b	9,68 ^a	11,40 ^b

Pastejo ou ramoneo é uma habilidade natural dos ruminantes domésticos e selvagens

Compostos naturais biologicamente ativos

- Um composto é biologicamente ativo quando exerce uma ação específica sobre um ser vivo: analgésico, anti-inflamatório, anti-microbiano, inseticida.
- Compostos secundários: quimicamente muito ativos, baixa densidade e presença de compostos aromáticos em sua estrutura

Compostos secundários - Classificação

- Fenilpropanoídes: taninos condensados, flavonoides, fitoestrógenos e cumarinas.
- Nitrogenados: alcaloides, aminoácidos, peptídeos, proteínas, glicosídeos cianogênicos, lectinas, inibidores das proteases e glicosinolatos
- Terpenos: óleos essenciais, lactonas e sesquiterpênicas, glicosídeos cardíacos e saponinas

Compostos secundários - Classificação

- Carboidratos poli-acetilênicos
- Oxalatos
- Ácidos orgânicos
- Aldeídos
- Cetonas
- Álcool
- Ésteres

Compostos secundários - Classificação

- Mecanismos de defesa das plantas gerados durante a evolução com os mamíferos herbívoros, insetos, pragas e doenças
- 800 polifenóis, 270 aminoácidos não proteicos, 32 compostos cianogênicos, 1000 alcaloides e várias saponinas.

Extratos vegetais – aditivos fitoquímicos

- Estimulo do consumo
- Estimulo da secreção enzimática no TGI
- Melhor absorção de nutrientes
- Estimulo do sistema imunológico
- Atividade antioxidante
- Atividade anti-inflamatória
- Atividade anti-parasitária
- Atividade anti-micorriziana

Extratos vegetais – aditivos fitoquímicos

- Atuam conjuntamente e de forma sinérgica, para potencializar os efeitos na resposta animal , melhorando o desempenho, a saúde e o bem-estar animal
- Uso na alimentação animal: sem legislação específica
- Substâncias GRASS: generally recognized as safe
- Extração e comercialização pode ser feita em pequenas propriedades

Mandioca: uma alternativa para agregação de valor socioambiental na agricultura familiar

Harold Ospina Patino, Zootecnista, M.Sc., D.Sc.
Faculdade de Agronomia- Curso de Zootecnia

A mandioca: motor de desenvolvimento social – Agroindústrias Sociais

- **Segurança alimentar**
- **Combustível social**
- **Aumento da produção e diversificação da renda familiar**
- **Sustentabilidade econômica, social e ambiental**
- **Sistemas integrados de produção em arranjos associativistas**

ÁCIDO CIANÍDRICO EM RAIZ INTEGRAL DA MANDIOCA

COMPONENTES (%)	FRESCA (mg/kg)	DESIDRATADA (mg/kg)
Raiz com casca	88 - 416	23 - 42
Casca	364 - 815	51 - 110
Raiz sem casca	34 - 301	17 - 27

Detoxificação da Mandioca

- Linamarina + oxigênio $\xrightarrow{\text{linamarase}}$
ácido cianhídrico + acetona + glucosa
- Lotaustralina + oxigênio $\xrightarrow{\text{linamarase}}$
ácido cianhídrico + butanona + glucosa
- $\text{HCN} + \text{S} \longrightarrow \text{Tiocianato}$

-
- Potencial fitogênico aliado a estratégias nutricionais.
 - Produção orgânica.
 - Novas oportunidades.
 - Novas áreas de pesquisa.

POTENCIAL COMPOSTOS FITOGÊNICOS DA MANDIOCA

**ATIVIDADE ANTI-HELMINTICA DE
COMPOSTOS FITOGÊNICOS
SOBRE AS VERMINOSES EM
RUMINANTES**

COMPOSTOS FITOGÊNICOS

- Taninos: hidrolisáveis e condensados
- Proantocianidinas(HCN).
- Mecanismos de ação (*L1-L3, L4, adultos*)

Parasitas susceptíveis:

H. contortus, *Trichostrongylus*, *Ostertagia*, *Nematodirus*
sp

Ostertagia ostertagi
arrested larva (early L4)

Haemonchus
placei

Trichostrongylus culibirformis

Efeito de vermifugação e suplementação com feno de mandioca no OPG (ovos/gr de fezes)

Semanas	Suplemento/anti-helmíntico			Animais		
	CONT	VERM	FM	Bovinos	Búfalos	SEM
1	837	437	512	775	658	52.0
2	587	362	369	492	417	111
3	525	387	469	425	475	124
4	525	200	368	367	383	63.0
Media	619 ^a	364.5 ^b (41)	429 ^b (31)	514	483	77.0

() Percentagem de diminuição de nematódeos comparado com o grupo controle.

Efeito de tres forragens no nível de infestação

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE AGRONOMIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA**

**EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM *Manihot
Esculenta Crantz*, SOBRE O DESEMPENHO ANIMAL
E A CARGA PARASITÁRIA EM OVINOS EM
CRESCIMENTO**

Mario Andrés Sierra Cano

Zootecnista Universidade de Antioquia – Colômbia

Orientador:

Prof. Harold Ospina Patiño

CARGA PARASITÁRIA

Ovos por Grama de fezes (OPG)

ESPÉCIES DE PARASITOS (L3)

ESPÉCIE	T1 (%)	T2 (%)	T3 (%)
<i>H. contortus</i>	0	57,27	70,54
<i>O. circumcincta</i>	0	2,90a	19b
<i>Oesophagostomum ssp</i>	0	5,45	1,36
<i>Cooperia ssp</i>	0	7,09	0

P<0,05; IC 95%

Inclusão de feno de mandioca em dietas com palha de arroz tratada com uréia (Chajula et al., 2004)

	% feno de Mandioca			
	0	25	50	100
Consumo MS (kg/dia)	9,2ab	9,8a	9,5a	8,4b
DMO (%)	61,7	61,4	61,0	67,3
DFDN (%)	51,8a	55,1b	55,2b	56,3b
Consumo EM (Mcal/dia)	19,9	19,9	19,6	20,0

Inclusão de feno de mandioca em dietas com palha de arroz tratada com uréia (Chajula et al., 2004)

	% feno de Mandioca			
	0	25	50	100
pH ruminal	6,7	6,6	6,8	6,9
NH ₃ – N (mg/dl)	12,9a	15,3b	16,2b	17,7b
BUN (mg/dl)	14,6a	15,3a	18,1b	21,3b
Protozoários (10 ⁵ células/g)	6,2a	4,4b	2,7bc	2,1c

CH_4

CH_4

CH_4

Sistema Lactoperoxidase

Lactoperoxidase

(Thiocyanate ion) + (Hydrogen Peroxide)----- (Antibacterial compound)

Atividade antimicrobiana de feno de mandioca em leite (Punthanara et al., 2009)

Ingredient (% by weight, kg)	T1	T2	T3	T4
Corn	28.9	36.9	40.9	52.9
Rice bran	12.0	15.0	15.0	16.0
Coconut meal	20.0	13.0	7.0	0
Wheat bran	15.0	10.0	12.0	4.0
Palm meal	0	10.0	16.0	22.0
Soy bean meal	21.0	12.0	6.0	2.0
Sulfur	0.1	0.1	0.1	0.1
Vitamin and mineral premix*	3.0	3.0	3.0	3.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
% Protein	19.39	16.21	13.09	10.31
% TDN	76.64	76.68	76.28	77.26
Concentrate intake (kg)/head/day	6	6	6	6
Cassava hay intake (kg)/head/day	0	1	2	3
Silage intake (kg)/head/day	25	25	25	25
Protein intake (kg)/head/day	1.83	1.86	1.89	1.94

Concentração de tiocianato

Treatments	Concentration of thiocyanate (ppm)				
	1 st Month	2 nd Month	3 rd Month	4 th Month	Means
T1	7.11 ^b	6.94 ^b	6.67 ^c	7.23 ^c	6.99 ^d
T2	14.39 ^a	13.24 ^a	13.22 ^b	13.43 ^b	13.57 ^c
T3	14.95 ^a	14.69 ^a	14.75 ^{ab}	15.18 ^{ab}	14.89 ^b
T4	15.99 ^a	15.74 ^a	15.82 ^a	16.08 ^a	15.90 ^a
SE	0.50	0.45	0.44	0.43	0.49

Bactérias Termofílicas no leite

Treatment	Thermophilic Count (CFU/ml)				
	1 st Month	2 nd Month	3 rd Month	4 th Month	Means
T1	121.25 ^a	120.00 ^a	122.50 ^a	123.75 ^a	121.88 ^a
T2	93.75 ^b	93.75 ^b	97.50 ^b	95.00 ^b	95.00 ^b
T3	80.00 ^{bc}	81.25 ^{bc}	88.75 ^{bc}	78.75 ^{bc}	82.19 ^c
T4	71.25 ^c	72.50 ^c	76.25 ^c	68.75 ^c	72.19 ^c
SE	4.72	3.75	3.99	4.38	3.85

Óleos Essenciais

Mecanismos de ação

- **Atividade contra bactérias Gram +;**
- **Controle do pH ruminal;**
- **Potencializa ingestão de alimento;**
- **Potencializa produção de carne;**
- **Potencializa produção de leite e sólidos totais;**
- **Não deprime produção de gordura.**

Capim Limão

(*Cymbopogon citratus* (DC.) Staf)

Manipulation of rumen ecology by dietary lemongrass (*Cymbopogon citratus* Stapf.) powder supplementation¹

M. Wanapat,^{*2} A. Cherdthong,^{*} P. Pakdee,^{*} and S. Wanapat[†]

^{*}Tropical Feed Resources Research and Development Center (TROFREC), Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand; and [†]Department of Plant Science and Natural Resources, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002, Thailand

ABSTRACT: This experiment was conducted to investigate the effect of lemongrass [*Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf] powder (LGP) on rumen ecology, rumen microorganisms, and digestibility of nutrients. Four ruminally fistulated crossbred (Brahman native) beef cattle were randomly assigned according to a 4 × 4 Latin square design. The dietary treatments were LGP supplementation at 0, 100, 200, and 300 g/d with urea-treated rice straw (5%) fed to allow ad libitum intake. Digestibilities of DM, ether extract, and NDF were significantly different among treatments and were greatest at 100 g/d of supplementation. However, digestibility of CP was decreased with LGP supplementation ($P < 0.05$), whereas ruminal $\text{NH}_3\text{-N}$ and plasma urea N were decreased with incremental additions of LGP ($P < 0.05$). Ruminal VFA concentrations were similar

among supplementation concentrations ($P > 0.05$). Total viable bacteria, amylolytic bacteria, and cellulolytic bacteria were significantly different among treatments and were greatest at 100 g/d of supplementation (4.7×10^9 , 1.7×10^7 , and 2.0×10^9 cfu/mL, respectively). Protozoal populations were significantly decreased by LGP supplementation. In addition, efficiency of rumen microbial N synthesis based on OM truly digested in the rumen was enriched by LGP supplementation, especially at 100 g/d (34.2 g of N/kg of OM truly digested in the rumen). Based on this study, it could be concluded that supplementation of LGP at 100 g/d improved digestibilities of nutrients, rumen microbial population, and microbial protein synthesis efficiency, thus improving rumen ecology in beef cattle.

Key words: lemongrass powder, manipulation, microbial protein synthesis, rumen ecology, rumen fermentation, supplementation

Uso de farinha de capim limão

	Farinha de capim limão (g/dia)			
	0	100	200	300
CMS (% PV)	2,7	2,7	3,0	3,1
DMS (%)	64,7 a	74,8 b	66,8 a	62,0 a
DFDN (%)	71,0 ab	77,5 a	71,9 ab	66,6 b

Uso de farinha de capim limão

	Farinha de capim limão (g/dia)			
	0	100	200	300
pH ruminal	6,5	6,5	6,4	6,4
N-NH₃ (mg/dl)	19,1 a	17,5 b	16,7 bc	15,7 c
Acético (mol/%)	69,3	67,7	70,7	71,0
Propiónico (mol/%)	22,0	24,1	21,0	20,4
Butírico (mol/%)	8,6	8,3	8,3	8,6

Uso de farinha de capim limão

	Farinha de capim limão (g/dia)			
	0	100	200	300
NR (g/d)	21,1 a	19,9 a	15,6 b	15,5 b
Prot. Microb (g N/d)	49,9 ab	57,5 a	45,3 b	43,1 b
ESPM (g N /kg MODR)	32,1 a	34,2 a	23,8 b	22,1 b

Uso de farinha de capim limão

	Farinha de capim limão (g/dia)			
	0	100	200	300
Células/g				
Bactérias (x10¹¹)	4,5 a	6,5 b	5,2 c	4,3 a
Protozoários (x10¹¹)	6,3 a	4,8 b	4,5 b	4,6 b
Fungos (x10¹¹)	0,7 a	1,1 b	0,8 c	0,7 a

Efeito dos óleos essenciais sobre a persistência na produção de leite

Efeitos do Essencial sobre rendimento da carcaça (Nunes do Prado et al., 2010)

Plantas Taniníferas

Uva (*Vitis vinifera* L.)

Fonte: www.folhavoria.com.br

Caqui (*Diospyros kaki* L.f.)

Fonte: www.kajhspa.com

Banana (*Musa paradisiaca* L.)

Fonte: www.1000dias.com

Goiaba (*Psidium guayava* Raddi)

Fonte: www.valevivaverde.blogspot.com

Caju (*Anacardium occidentale* L.)

Fonte: www.nutricaojoyce.com.br

Plantas Taniníferas

Barbatimão (*Stryphnodendron adstringens*)

Fonte: <http://portalteses.icict.fiocruz.br>

Angico (*Anadenanthera Macrocarpa*)

Fonte: <http://portalteses.icict.fiocruz.br>

Aroeira (*Lithraea molleoides*)

Fonte: <http://portalteses.icict.fiocruz.br>

Plantas Taniníferas Zootécnicas

Cornichão (*Lotus corniculatus*)

Fonte: <http://www.wildaboutgardens.org.uk/>

Trevina ou trevinha (*Lotus pedunculatus*)

Fonte: <http://wildseed.co.uk/>

Alfafa (*Medicago sativa*)

Fonte: <http://www.swcoloradowildflowers.com/>

Azevém perene (*Lolium perenne*)

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/>

Plantas Taniníferas Zootécnicas

Quebracho (*Schinopsis Lorentzii*)
Fonte: en.wikipedia.org

Sorgo (*Sorghum bicolor M.*)
Fonte <http://www.sagra.com.ar>

Acácia (*Acacia cyanophylla*)
Fonte: [http://pt.wikipedia.org/](http://pt.wikipedia.org)

Acacia negra ou mimosa (*Acacia Mearnsii*)
Fonte: <http://portalteses.icict.fiocruz.br>

Plantas Taniníferas Zootécnicas

Feijão guandu cv. Anão (*Cajanus cajan*)
Fonte: <http://www.pirai.com.br/>

Sansão do campo ou sabiá
(*Mimosa caesalpineafolia*)
Fonte: www.productobuscado.com.br

Leucena (*Leucaena leucocephala*)
Fonte: <http://arvorearbrasil.blogspot.com.br/>

Catingueira (*Caesalpinia pyramidalis Tul.*)
Fonte: <http://www.onordeste.com/>

Considerações finais

A grande biodiversidade vegetal existente nos ecossistemas tropicais e subtropicais são um banco de Germoplasma, que oferece novas alternativas para obtenção de aditivos fitoquímicos que podem garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental da agropecuária.

Muito obrigado.....